

063

EFEITO DO FUNGICIDA TRIADIMEFON A DIFERENTES INTERVALOS DE APLICAÇÃO NO CONTROLE À *Puccinia alii* EM ALHO.

José Tadeu Athayde¹, Álvaro Figueredo dos Santos¹ e Antonio Alberto da Silva¹

RESUMO

O fungicida Triadimefon tem apresentado controle de 100% em relação à ferrugem do alho (*Puccinia alii*) (ATHAYDE et alii, 1982, 22º Congresso Brasileiro de Olericultura), com aplicações a intervalo de 7 dias, na dose de 50g de p.a. por 100 litros de água, em pulverizações, até o ponto de escorrimento.

No presente trabalho, instalado no município de Domingos Martins-ES estudaram-se cinco intervalos de aplicação: 7, 14, 21, 28 e 35 dias, na dose de 50g de p.a. por 100 litros de água. Empregou-se o delineamento de blocos ao acaso, com três repetições, parcelas de 12m², com 3m² de área útil.

Aos 110 dias após o plantio, os diferentes intervalos diferiram da testemunha, sendo que os tratamentos de 7 e 14 dias apresentaram 100% de controle. Os demais tratamentos apresentaram um aumento progressivo do número de pustulas, por planta, para 21, 28 e 35 dias, respectivamente.