

OCORRÊNCIA E SINTOMAS DA "MELEIRA" DO MAMOEIRO (C. PAPAYA L.) NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. C.H. RODRIGUES¹, F.L. ALVES¹, S.L.D. MARIN¹ (¹EMCAPA/Estação Exp. de Linhares, C.P. 62, Linhares, ES, 29900). Occurrence and symptoms of "Meleira" in papaya (C. papaya L.) in the Espírito Santo State, Brazil.

O Estado do Espírito Santo, principalmente a região Norte, constitui um importante produtor de mamão (C. papaya, cv. Sunrise Solo), tanto para o mercado interno quanto para o externo. Nos últimos anos vem sendo observado, nas lavouras da região, um distúrbio cuja etiologia ainda não é bem definida. O seu principal sintoma é a exudação de látex nos frutos, que oxida, dando um aspecto "borrado" ou "melado", depreciando a sua qualidade de comercial. Esta também é observada nos pecíolos e extremidade de folhas novas, independentemente da idade das plantas. Em plantas jovens (⁺ 6 meses) os primeiros sintomas surgem nas extremidades das folhas. no vas, provocando queima e alteração de sua forma. O látex do fruto com me leira escorre facilmente por ter menor viscosidade, possui coloração branco translúcida e não se coagula com facilidade. Outros sintomas frequentemente observados em plantas doentes são a má formação e o aparecimento de áreas amareladas nos frutos.