



EMCAPA

Empresa Capixaba de Pesquisa Agropecuária
Caixa Postal - 125
29.154 - Campo Grande - Cariacica (ES)
Vinculada à Secretaria de Estado da Agricultura

ISSN

PESQUISA EM ANDAMENTO

Nº 05 Setembro/1982 p.1/2

PASTEJO E DESMAMA PRECOSES DE BEZERROS DA RAÇA LEITEIRA

Marcos Antonio Barbosa¹
Joil Angelo Espindula Agostini²

O custo elevado da criação de bezerros faz com que grande parte dos produtores de gado de leite descartem estes animais, logo após o nascimento. Com o objetivo principal de tentar diminuir estes custos, está sendo conduzido um experimento de manejo de bezerros, na Fazenda Experimental "Bananal do Norte", da EMCAPA, em Cachoeiro do Itapemirim. Esta fase do trabalho foi iniciada em janeiro de 1982 e deverá ser concluída neste mesmo ano. O experimento será repetido com animais nascidos na época da seca.

Consta de quatro tratamentos, a saber:

1. Aleitamento, durante cinco semanas, com o bezerro a pasto, a partir da primeira semana de vida.
2. Aleitamento, durante sete semanas, com o bezerro a pasto, a partir da primeira semana de vida.
3. Aleitamento, durante cinco semanas, com o bezerro em estábulo; e pastejo a partir da sexta semana.
4. Aleitamento, durante sete semanas, com o bezerro em estábulo; e pastejo a partir da oitava semana.

¹ Pesquisador MS - EMCAPA

² Pesquisador MS - EMBRAPA/EMCAPA

Durante a fase de aleitamento, foram fornecidos 3 ℓ de leite individualmente, pela manhã, no balde e de uma só vez, para todos os bezerros do experimento. Ainda nesta fase, todos os animais receberam uma ração concentrada com 16% de proteína à vontade e, após o desaleitamento, o consumo foi limitado em 1,7 kg por animal, até os seis meses de idade. Os bezerros que ficaram estabulados receberam, neste período, volumoso à vontade, constituído de capim elefante picado.

Os resultados parciais (56 dias após o início do experimento), expressos em ganho médio de peso, por tratamento, foram praticamente iguais, como se pode observar na tabela 1.

Aparentemente, os animais levados com uma semana de idade, para o pasto, apresentavam melhor aspecto sanitário do que os estabulados.

TABELA 1 - Ganho médio de peso dos bezerros com 56 dias de idade, por tratamento

Local de Criação	Desmame	Ganho de Peso (kg/dia)
Pasto	5 semanas	0,40
	7 semanas	0,40
*Estabulado	5 semanas	0,36
	7 semanas	0,41

*Estabulado até a 5ª e 7ª semanas de idade