02 COMPORTAMENTO DE CULTIVARES E HÍBRIDOS DE ABÓBORA (**Cucurbita sp Duch**) NA REGIÃO BAIXA DE VIANA, ESPÍRITO SANTO. BALBINO, J.M.de S.; SOUZA, J.L.de; COSTA,H.; FORNAZIER, M.J.; LOUZADA, J.da S.; MORELI, A.P. & MULLER NETO, A.(Estação Experimental Mendes da Fonseca/EMCAPA, 29375 - Venda Nova-ES).

Foi instalado um experimento na Fazenda Experimental de Viana/EMCAPA (20m de altitude), no período de inverno, num delineamento de blocos casualizados com 4 repetições, com o objetivo de avaliar cultivares e híbridos de abóbora comum, visando fornecer informações e opções de cultivo. Avaliou-se o comportamento das cultivares: Baiana Tropical, Jacarezinho AG-1, Jacarezinho AG-2, Mini Paulista; dos híbridos Tetsukabuto e Lavras-2 e da cultivar Paquinha (material regional selecionado na região de Muniz Freire). Os resultados apontararm a cultivar Paquinha com o maior rendimento (34,2t/ha) e peso médio de frutos de 2,0kg. Os demais materiais não diferiram significativamente entre si quanto ao rendimento, tendo "Jacarezinho AG-1" e "AG-2", 23,8t/ha e peso médio de frutos de 1,97 e 1,85kg respectivamente; "Mini Paulista" 22,0t/ha e peso médio de frutos de 1,04kg; "Tetsukabuto" 20,7t/ha e peso médio de frutos de 2,04kg, "Lavras-2" 18,6t/ha e peso médio de frutos de 1,99kg e "Baiana Tropical" 17,1t/ha e peso médio de frutos de 1,73kg. Os híbridos foram os mais precoces (ciclo de 101 dias) e a cultivar Paquinha (de 138 dias) a de ciclo mais tardio.