

MEDIDAS PARA EVITAR A FUSARIOSE EM CULTURAS A SEREM FORMADAS

- Não usar mudas ou estacas provenientes de lavouras doentes ou com suspeita da doença.
- As mudas ou estacas devem ser adquiridas somente de produtores fiscalizados pelo Ministério da Agricultura.

Na formação de mudas é necessário tomar os seguintes cuidados:

- Colocar as estacas durante 10 minutos numa mistura, contendo 10 gramas de BENLATE em 10 litros de água.
- A terra, já misturada com os adubos para enchimento das sacolas, deverá ser esterelizada com FORMICIDA BLENCO.

OBS.: 1 lata de 393 cc esteriliza 1 metro cúbico de terra.

- Nunca plantar um Pimental próximo a Pimentais com FUSARIOSE.



EMATER-ES
VINCULADA À SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA



FUSARIOSE DA PIMENTA-DO-REINO



O QUE É A FUSARIOSE



A FUSARIOSE É UMA DOENÇA QUE PODE DESTRUIR UMA CULTURA DE PIMENTA - DO - REINO EM MENOS DE 2 ANOS

OS PRINCIPAIS SINTOMAS DA FUSARIOSE EM PIMENTA - DO - REINO SÃO:

- APODRECIMENTO DAS RAÍZES
- AMARELECIMENTO E SECA DAS FOLHAS
- AMARELECIMENTO DOS ENTRE - NÓS, QUE SE DESPRENDEM E CAEM, PROSSEGUINDO ATÉ A MORTE TOTAL DA PLANTA

COMO CONTROLAR A FUSARIOSE EM CULTURAS JÁ FORMADAS



- Arrancar e queimar as plantas doentes logo que apareçam os sintomas da FUSARIOSE.



- Regar a terra onde foi arrancada a planta doente com uma mistura de 30 gramas de DIFOLATAN ou ORTODIFOLATAN em 10 litros de água
- O nematódeo facilita a penetração do FUSÁRIO nas raízes da planta, devendo ser combatido com o uso de Nematicida.

Fazer práticas culturais adequadas, relacionadas com:

- Amontoa em volta da base do caule.
- Proteção do solo contra a erosão.