




EMATER-ES

AS PRINCIPAIS


PRAGAS

DO MILHO

AS PRINCIPAIS PRAGAS DO MILHO



● 1. FORMIGA



● 2. LAGARTA DO CARTUCHO



● 3. LAGARTA DAS ESPIGAS
OU DAS FOLHAS

POR QUE ESTAS PRAGAS PRECISAM SER COMBATIDAS?

A formiga cortando as plantas novas, diminui o número de pés de milho. Com isto a produção é menor.

As lagartas comendo folhas, cartucho e espigas, podem até destruir completamente a sua lavoura.

COMBATA AS PRAGAS E NÃO PERCA DINHEIRO

FORMIGA

1. Medir o formigueiro com passos largos de mais ou menos 1 metro, cruzando a terra solta.



2. Multiplicar o número de passos para achar o tamanho do formigueiro.

Exemplo:



$$4 \text{ passos vezes } 3 \text{ passos} = 12 \text{ metros quadrados}$$

3. Para cada metro quadrado, colocar nos carregadores do formigueiro, 10 gramas (meia colher de sopa) de isca formicida.

LAGARTAS


1. O produto recomendado é o Carbaryl 85 % PM.
2. Para preparar 100 litros de remédio, misturar 140 gramas (7 colheres de sopa) do produto em 100 litros de água.
3. É preciso preparar cinco vezes esta quantidade, para aplicar em 1 hectare.



CUIDADOS NA APLICAÇÃO

- . Pulverizar no início do ataque das pragas
- . Pulverizar em todas as partes atacadas do milho
- . Não pulverizar com chuva, para não perder o remédio.
- . Não pulverizar contra o vento para não respirar o remédio.

ATENÇÃO



1. Não FUMAR, COMER ou BEBER durante a pulverização.
2. Evitar tocar o produto com as mãos.
3. Se o produto tocar diretamente qualquer parte do corpo, lavar logo com água fria e sabão.
4. Não usar aparelhos com vazamento.
5. Não desentupir os bicos de pulverizadores com a boca.
6. Depois da pulverização tomar banho com água fria e sabão.
7. Guardar o produto fora do alcance de crianças.
8. Queimar as embalagens vazias
9. Se aparecer intoxicação, procure um médico imediatamente.

PARA MAIORES INFORMAÇÕES PROCURE O
ESCRITÓRIO LOCAL DA EMATER-ES

IMPRESSO NA EMATER-ES