

291

BIBLIOTECA  
CENTRAL  
EMATER - ES




**EMATER-ES**

VINCULADA À SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA  
ASSOCIADA À EMBRATER / MINISTÉRIO DA AGRICULTURA



# ***COMO TORNAR A SUINOCULTURA MAIS LUCRATIVA***




As instalações devem ser construídas de forma que o sol percorra toda a cumieira. Isso faz com que a temperatura fique mais agradável para os animais.


Na construção da granja, usar recursos da propriedade como: madeira e resto de construção. Dessa maneira gasta-se menos com material e mão-de-obra.



O cachaço deve ter um piquete gramado e amplo, onde ele possa andar. Esse exercício torna o cachaço mais vigoroso e faz bem para os cascos.




A bái do cachaço, deve ficar no meio das celas das fêmeas em gestação, com grade de vergalhão nas laterais para ver as porcas. Isto ajuda a estimular o cio.



As marrãs devem ser cobertas pelo cachaço no 3º cio fértil e as porcas no 1º cio após a desmama. A cobertura deve ser realizada 28 horas após o aparecimento do cio e repetir a operação 12 horas após a primeira.


As fêmeas em gestação devem ser confinadas individualmente e receber ração no máximo 1 quilo pela manhã e 1 quilo a tarde. Diminuir a quantidade se ficarem muito pesadas. Se não confinar pode haver agressão e ocasionar o aborto.



Entre uma refeição e outra dar alimento verde às fêmeas em gestação, para que fiquem mais calmas. Nunca jogar sobre elas, jatos de água. Pode provocar aborto.




A maternidade deve estar lavada e desinfetada para receber a fêmea, 3 dias antes do parto. A fêmea deve ser lavada com água e sabão, principalmente o aparelho genital e mamário.





O parto deve ser acompanhado todo o tempo. Se surgir problemas, chame um médico veterinário. Limpar os leitõezinhos com um pano úmido, depois cortar o umbigo e os dentes. Os leitõezinhos mais fracos devem ser orientados para sugar as tetas dianteiras, têm mais leite e são mais fáceis de pegar.

É extremamente importante o aquecimento dos leitõezinhos depois de nascerem. Essa operação vai estimular o desenvolvimento do aparelho termo regulador.

A falta desse aquecimento proporciona graves problemas retardando o desenvolvimento dos leitões.



**Não pode existir umidade na maternidade pois provoca doenças respiratórias e diarreias. Para evitar a umidade poderão usar o cepilho. A alimentação da mãe é de 1,8 quilos de ração e mais 400 gramas por leitão que está sendo amamentado.**



**Logo nos primeiros dias, os leitõezinhos devem ser orientados a comer ração inicial. Eles não podem ter acesso a ração da mãe. Entre os 35 a 42 dias os leitões são desmamados. Porém antes do desmame diminuir a ração da porca para secar o leite.**

Após a desmama o esquema a ser usado de ração é o seguinte:

1º e 2º dia – 75% inicial e 25% crescimento

3º e 4º dia – 50% inicial e 50% crescimento

5º e 6º dia – 25% inicial e 75% crescimento

7º dia em diante – 100% crescimento.

Os leitões depois de desmamados são colocados na creche. A parede divisória entre uma e outra deve ser de tela, para facilitar o contato entre as leitegadas. Nesse caso vai evitar agressões quando juntarem as leitegadas. Após a desmama, não mudar logo a ração inicial para a de crescimento. A mudança deve ser gradual. Vide quadro ao lado.


Os leitões devem ficar na creche até quando tiverem 20 quilos de peso vivo.

Depois vão para a recria.



Na recria os leitões ficam até quando atingirem 60 quilos de peso vivo.

Nesse período é preciso observar os seguintes cuidados:

- Formar grupos uniformes
  - Evitar super lotação
- Juntar animais de leitegadas diferentes nas horas mais frescas
  - Dar ração à vontade.



O período de terminação inicia quando os animais começam a atingir mais de 60 quilos. Não devem passar dos 100 quilos, isto porque, a conversão ração + porco, piora além de aumentar a gordura. Deve usar o espaçamento de um animal por metro quadrado. Dar ração à vontade.



É importante que o criador procure baratear o custo da produção. Para tal o melhor é diminuir o custo da ração, plantando milho, mandioca e outros alimentos alternativos. O criador pode também produzir o concentrado.

TODAS AS ORIENTAÇÕES CONTIDAS NESTE  
FOLHETO, SÃO RELATIVAMENTE  
FÁCEIS DE SEREM SEGUIDAS PELOS PRODUTORES  
PORÉM, É MUITO IMPORTANTE QUE  
O CRIADOR PROCURE A ASSISTÊNCIA TÉCNICA  
DA EMATER-ES DE SEU MUNICÍPIO.  
É IMPORTANTE TAMBÉM QUE OS CRIADORES  
PARTICIPEM DAS REUNIÕES E  
CURSOS PROMOVIDOS PELA  
EMATER-ES.